

Dépistage du cancer du sein
 (Ensemble d'indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)

Définition	Pourcentage des patientes âgées de 50 à 74 ans à qui on a prescrit une mammographie.	
Méthode de calcul	Numérateur	<p>Nombre de personnes dans le dénominateur à qui on a prescrit une mammographie au cours des 36 derniers mois.</p> <p>Inclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes dans le dénominateur • Personnes à qui on a prescrit une mammographie au cours des 36 derniers mois <p>Exclusions</p> <p>Aucune</p>
	Dénominateur	<p>Nombre de clientes ou de patientes de 50 à 74 ans qui reçoivent des soins de santé primaires (SSP).</p> <p>Inclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clients ou patients qui reçoivent des SSP • Personnes de sexe féminin • Personnes âgées de 50 à 74 ans <p>Exclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes qui ont subi une mastectomie bilatérale
Source des données	Dossier médical électronique	
Remarques	<p>Définition des termes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un client ou patient qui reçoit des SSP est une personne qui a été en contact avec le dispensateur au moins une fois durant l'année précédente et qui a un dossier avec ce dispensateur depuis au moins deux ans. 	
Interprétation	<ul style="list-style-type: none"> • Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. • Cet indicateur tient compte uniquement des personnes à qui on a prescrit une mammographie, selon l'information enregistrée dans le dossier médical électronique. Il n'indique pas si la mammographie a eu lieu ou non (p. ex. refus de la patiente). 	



Dépistage du cancer du sein
(Ensemble d'indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires) (suite)

<p>Justification de l'indicateur</p>	<p>Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes canadiennes (environ 23 400 nouveaux cas en 2011)¹; il représente plus de 30 % de tous les nouveaux diagnostics de cancer chez les femmes de 20 à 69 ans et 20 % chez les femmes de 70 ans ou plus. Une Canadienne sur neuf sera atteinte du cancer du sein et une sur vingt-sept en mourra².</p> <p>La détection précoce du cancer du sein est importante pour accroître les options de traitement et améliorer les résultats chez les femmes atteintes. Au Canada, la mortalité liée au cancer du sein connaît une diminution constante, en particulier chez les femmes de moins de 60 ans. En général, cette diminution est attribuable aux progrès réalisés en matière de dépistage, notamment grâce à la mise en place de programmes organisés de dépistage, à la hausse des taux de participation, à l'amélioration de la qualité des mammographies et au perfectionnement des modes de traitement².</p> <p>En 2011, le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs a recommandé l'adoption de nouvelles lignes directrices en matière de dépistage pour les femmes de 40 à 74 ans présentant un risque modéré de développer un cancer du sein (c'est-à-dire, qui n'en ont jamais été atteintes, qui ne comptent aucun cas de cancer du sein parmi leurs parents de premier degré, chez qui aucune mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 n'a été observée et dont la paroi thoracique n'a jamais été exposée à la radiation)³. Ces lignes directrices suggèrent un dépistage de routine tous les deux ou trois ans chez les femmes de 50 à 74 ans^{3, 4}.</p> <p>Le dispensateur de SSP joue un rôle essentiel dans la détection du cancer du sein au début de sa progression en recommandant des examens de dépistage à ses patientes et en surveillant les résultats de ces examens.</p>
<p>Références</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comité directeur des statistiques sur le cancer de la Société canadienne du cancer. <i>Canadian Cancer Statistics 2011</i>. Toronto, ON : Société canadienne du Cancer; 2011. www.cancer.ca/statistics. 2. Société canadienne du cancer /Institut national du cancer du Canada. <i>Canadian Cancer Statistics 2007</i>. Toronto, ON : Société canadienne du cancer; 2007. 3. Tonelli M, Gorber SC, Joffres M, et al. Recommendations on screening for breast cancer in average-risk women aged 40-74 years. <i>CMAJ</i>. 22 novembre 2011;183(17):1991-2001. PM:22106103. 4. Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. Screening for Breast Cancer. http://www.canadiantaskforce.ca/recommendations/2011_01_eng.html. Consulté le 8 février 2012.

Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de déclaration des SSP, visitez le site Web de l'ICIS au www.icis.ca/ssp ou envoyez-nous un courriel à l'adresse ssp@icis.ca.