

**Dépistage du cancer du col de l'utérus  
(Ensemble d'indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)**

<b>Définition</b>	Pourcentage des patientes âgées de 18 à 69 ans qui ont subi un test de Papanicolaou.	
<b>Méthode de calcul</b>	<b>Numérateur</b>	<p>Nombre de personnes dans le dénominateur qui ont subi un test de Papanicolaou au cours des 36 derniers mois.</p> <p><b>Inclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personnes dans le dénominateur</li> <li>• Personnes qui ont subi un test de Papanicolaou au cours des 36 derniers mois</li> </ul> <p><b>Exclusions</b></p> <p>Aucune</p>
	<b>Dénominateur</b>	<p>Nombre de clientes ou de patientes de 18 à 69 ans qui reçoivent des soins de santé primaires (SSP)</p> <p><b>Inclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clients ou patients qui reçoivent des SSP</li> <li>• Personnes de sexe féminin</li> <li>• Personnes âgées de 18 à 69 ans</li> </ul> <p><b>Exclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personnes qui ont subi une hystérectomie</li> </ul>
<b>Source des données</b>	Dossier médical électronique	
<b>Remarques</b>	<p><b>Définition des termes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un client ou patient qui reçoit des SSP est une personne qui a été en contact avec le dispensateur au moins une fois durant l'année précédente et qui a un dossier avec ce dispensateur depuis au moins deux ans.</li> </ul>	
<b>Interprétation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif.</li> </ul>	



Dépistage du cancer du col de l'utérus  
(Ensemble d'indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires) (suite)

<p><b>Justification de l'indicateur</b></p>	<p>Même si l'incidence du cancer du col de l'utérus a chuté de façon drastique au Canada depuis l'arrivée du test de Papanicolaou (Pap) en 1949<sup>1</sup>, les effets de la maladie sont toujours bien présents; on estime à 1 300 le nombre de nouveaux cas en 2011 et 350 le nombre de femmes qui sont décédées de la maladie<sup>2</sup>.</p> <p>Des recherches indiquent que le dépistage du cancer du col de l'utérus permet de détecter les lésions précancéreuses avant leur progression au stade de cancer invasif<sup>3, 4</sup>. En outre, des études ont révélé que les femmes ayant reçu un diagnostic de cancer invasif du col de l'utérus étaient moins susceptibles d'avoir subi un examen de dépistage au cours des cinq années précédant le diagnostic ou n'avaient pas fait l'objet d'un suivi adéquat après un test Pap aux résultats anormaux<sup>4</sup>. Ces conclusions soulignent l'importance du dépistage et du suivi par les dispensateurs de SSP dans la réduction de l'incidence de la maladie et de la mortalité qui y est associée.</p> <p>Des lignes directrices en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus au Canada ont été établies en 1989 et font l'objet d'une évaluation par le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs<sup>5</sup>. Les lignes directrices de Santé Canada recommandent un examen de dépistage chez les femmes de 18 ans ou plus ou qui deviennent actives sexuellement, suivi d'un second examen un an plus tard. Si les résultats sont satisfaisants, les lignes directrices recommandent un dépistage tous les trois ans jusqu'à l'âge de 69 ans<sup>6</sup>.</p> <p>Les dispensateurs de SSP jouent un rôle de premier plan dans le dépistage du cancer du col de l'utérus chez leurs patientes en effectuant des tests Pap selon les lignes directrices et en surveillant les résultats de ces tests.</p>
<p><b>Références</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comité directeur des statistiques sur le cancer de la Société canadienne du cancer. <i>Canadian Cancer Statistics 2008</i>. Toronto, ON : Société canadienne du Cancer; 2008.</li> <li>2. Comité directeur des statistiques sur le cancer de la Société canadienne du cancer. <i>Canadian Cancer Statistics 2011</i>. Toronto, ON : Société canadienne du Cancer; 2011. <a href="http://www.cancer.ca/statistics">www.cancer.ca/statistics</a>.</li> <li>3. Ng E, Wilkins R, Fung MF, Berthelot JM. Cervical cancer mortality by neighbourhood income in urban Canada from 1971 to 1996. <i>CMAJ</i>. 11 mai 2004;170(10):1545-1549. PM:15136547.</li> <li>4. Spence AR, Goggin P, Franco EL. Process of care failures in invasive cervical cancer: systematic review and meta-analysis. <i>Prev Med</i>. Août 2007;45(2-3):93-106. PM:17651792.</li> </ol>

Dépistage du cancer du col de l'utérus  
(Ensemble d'indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires) (suite)

5. Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. Current Task Force recommendations. [http://www.canadiantaskforce.ca/recommendations\\_current\\_eng.html](http://www.canadiantaskforce.ca/recommendations_current_eng.html). Consulté le 8 février 2012.
6. Santé Canada. It's Your Health. Screening for Cervical Cancer. <http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/diseases-maladies/cervical-uterus-eng.php>. Consulté le 8 février 2012.

Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de déclaration des SSP, visitez le site Web de l'ICIS au [www.icis.ca/ssp](http://www.icis.ca/ssp) ou envoyez-nous un courriel à l'adresse [ssp@icis.ca](mailto:ssp@icis.ca).