

Répétition inutile de tests médicaux par des dispensateurs de SSP  
(Ensemble d'indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)

<b>Définition</b>	Pourcentage des dispensateurs de soins de santé primaires (SSP) qui ont repris des tests médicaux au cours du dernier mois parce que les premiers résultats étaient indisponibles.	
<b>Méthode de calcul</b>	<b>Numérateur</b>	<p>Nombre de personnes dans le dénominateur qui ont repris des tests médicaux au cours du dernier mois parce que les premiers résultats étaient indisponibles.</p> <p><b>Inclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personnes dans le dénominateur</li> <li>• Personnes ayant déclaré avoir repris des tests ou des interventions au cours du dernier mois parce que les premiers résultats étaient indisponibles</li> </ul> <p><b>Exclusions</b></p> <p>Aucune</p>
	<b>Dénominateur</b>	<p>Nombre de dispensateurs de SSP répondants.</p> <p><b>Inclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispensateurs de SSP</li> </ul> <p><b>Exclusions</b></p> <p>Aucune</p>
<b>Source des données</b>	Outils d'enquête fondée sur la pratique des SSP au Canada : section à l'intention des fournisseurs de soins <sup>1</sup>	
<b>Remarques</b>	Sans objet	
<b>Interprétation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un taux faible pour cet indicateur est interprété comme un résultat positif.</li> </ul>	
<b>Justification de l'indicateur</b>	<p>La répétition inappropriée de tests médicaux perturbe le patient et entraîne des coûts inutiles pour le système de santé<sup>2</sup>.</p> <p>Pour la plupart des Canadiens, le premier point de contact pour obtenir des soins médicaux est le milieu de SSP; la majorité d'entre eux déclarent d'ailleurs avoir un médecin de famille habituel<sup>3</sup>. On estime que 4,2 millions de Canadiens de 12 à 74 ans sont atteints d'au moins une condition propice aux soins ambulatoires, environ 46 % souffrant d'hypertension, 43 % de maladie du cœur, 36 % de diabète, 30 % d'asthme et 16 % de maladie pulmonaire obstructive chronique<sup>4</sup>. De ce nombre, 161 000 personnes (3,8 %) ont déclaré avoir été hospitalisées au moins une fois sur une période de quatre ans<sup>4</sup>. Les patients atteints d'affections chroniques ont plus fréquemment recours au système de</p>	



Répétition inutile de tests médicaux par des dispensateurs de SSP  
(Ensemble d'indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires) (suite)

santé et exigent un éventail élargi de services de santé. Au fil de la prestation de ces services, les renseignements qui les concernent doivent être ajoutés au dossier de SSP du patient auprès de son dispensateur habituel.

Lors d'un sondage sur l'expérience des Canadiens avec le système de SSP, la plupart des adultes qui ont consulté un médecin au moins une fois au cours des 12 derniers mois ont déclaré que leur médecin n'a pas répété de tests inutilement (92 %), et la majorité (84 %) d'entre eux ont indiqué que les résultats de leurs tests étaient disponibles au moment de leur visite<sup>5</sup>.

L'échange d'information dans le milieu des SSP est essentiel à la continuité et à l'intégralité des soins, qui peuvent être affectées si les résultats des tests ne sont pas disponibles au point de service<sup>6</sup>.

Références

1. Institut canadien d'information sur la santé. Primary Health Care: Pan-Canadian Primary Health Care Survey Questions and Tools. <http://www.cihi.ca/CIHI-ext-portal/internet/EN/TabbedContent/types+of+care/primary+health/cihi006583>. Dernière modification en 2011. Consulté le 5 septembre 2012.
2. Fyke KJ. *Caring for Medicare: Sustaining a Quality System*. Regina, SK: Saskatchewan Health; 2001. [www.health.gov.sk.ca/mc\\_dp\\_commission\\_on\\_medicare-bw.pdf](http://www.health.gov.sk.ca/mc_dp_commission_on_medicare-bw.pdf).
3. Santé Canada. *Healthy Canadians-A Federal Report on Comparable Health Indicators 2010*. Ottawa, ON : Santé Canada; 2011. <http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/system-regime/index-eng.php>. Consulté le 4 septembre 2012.
4. Sanmartin C, Khanand S, et l'équipe de recherche sur les DLAS. *Hospitalizations for Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC): The Factors That Matter*. Statistics Canada: 2011. <http://www.statcan.gc.ca/pub/82-622-x/82-622-x2011007-eng.pdf>. Consulté le 22 février 2012. 82-622-X - N° 007.
5. Conseil canadien de la santé. *Canadian Survey of Experiences With Primary Health Care in 2007: A Data Supplement to: Fixing the Foundation: An Update on Primary Health Care and Home Care Renewal in Canada*. Toronto, ON : le Conseil; 2008.
6. Reid R, Haggerty J, et McKendry R. *Defusing the Confusion: Concepts and Measures of Continuity of Healthcare*. Ottawa, ON : Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé; 2002.

Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de déclaration des SSP, visitez le site Web de l'ICIS au [www.icis.ca/ssp](http://www.icis.ca/ssp) ou envoyez-nous un courriel à l'adresse [ssp@icis.ca](mailto:ssp@icis.ca).