



www.icis.ca

Au cœur des données



Institut canadien
d'information sur la santé

Canadian Institute
for Health Information

Condensé

Février 2016

Le SNIUMP contient des données sur les demandes de remboursement de médicaments prescrits qui sont recueillies auprès des régimes publics d'assurance-médicaments au Canada.

Le SISLD comprend des renseignements détaillés sur les caractéristiques cliniques et fonctionnelles et sur les services. Ces renseignements indiquent les préférences, les besoins et les points forts des résidents et donnent un aperçu des services auxquels ils ont recours en SLD.

L'analyse regroupe les données du SNIUMP sur les demandes de remboursement de médicaments et les données du SISLD sur les évaluations des résidents.

Autres ressources

Les produits complémentaires suivants sont offerts sur le [site Web de l'ICIS](#) :

- rapport
- communiqué

Contactez-nous

Renseignements
sur les données :
medicaments@icis.ca

Demandes des médias :
media@icis.ca

Tendances liées aux médicaments en SLD

Utilisation d'antipsychotiques chez les personnes âgées résidant dans les établissements de soins de longue durée, 2014

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) se penche sur l'utilisation générale d'antipsychotiques dans les établissements de soins de longue durée (SLD), ce qui comprend les cas où leur utilisation est appropriée. Ce rapport est le premier à utiliser les données du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) et du Système d'information sur les soins de longue durée (SISLD) pour analyser l'utilisation des médicaments chez les personnes âgées en SLD.

Le rapport révèle que 39 % des personnes âgées en SLD se sont vu prescrire un antipsychotique au moins une fois en 2014. Les antipsychotiques sont souvent prescrits aux personnes âgées pour traiter les symptômes de la démence et d'autres psychoses, mais ils peuvent causer des effets secondaires dangereux.

Principales constatations

- L'utilisation d'antipsychotiques était plus élevée chez les résidents présentant une déficience cognitive grave (36,5 %) et un comportement très agressif (51 %).
 - Les chiffres suggèrent que des approches non pharmacologiques ont été envisagées, même dans les cas les plus graves où les résidents et le personnel soignant risquaient de subir des blessures.
- Les résidents étaient plus susceptibles de se faire prescrire un antipsychotique que les résidentes (42,5 % contre 37,5 %).
- Le taux d'utilisation d'antipsychotiques diminuait avec l'âge.
 - Chez les 65 à 74 ans, près de la moitié ont présenté au moins une demande de remboursement pour un antipsychotique, comparativement au tiers des 85 ans et plus.
- Cette étude examine l'utilisation générale d'antipsychotiques en SLD. Or, selon une autre étude de l'ICIS, le taux d'utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques en SLD serait d'environ 30 %. Vous trouverez plus de renseignements dans [l'outil Web Votre système de santé : En détail](#).