



## Fiche d'information

La Direction de l'analyse du système de santé et des questions émergentes fait partie du Secteur de la recherche et de l'analyse de l'ICIS. Elle produit des rapports sur la santé relatifs aux politiques, des analyses en bref et des projets à court délai qui visent à répondre aux questions émergentes concernant les soins de santé. De plus, en collaboration avec des partenaires clés, dont le milieu de la recherche, elle transforme les données en information pertinente en vue de la gestion éclairée du système de santé canadien.

### Notre vision

De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en meilleure santé

### Notre mandat

Exercer le leadership visant l'élaboration et le maintien d'une information sur la santé exhaustive et intégrée pour des politiques avisées et une gestion efficace du système de santé qui permettent d'améliorer la santé et les soins de santé

### Nos valeurs

Respect, intégrité, collaboration, excellence, innovation

# Les plaies difficiles au Canada : sommaire

Les plaies constituent un grave problème de santé et s'accompagnent de profondes répercussions personnelles, cliniques et économiques. Le rapport *Les plaies difficiles au Canada* examine la prévalence des plaies dites « difficiles » en 2011-2012 dans les milieux de soins de santé au Canada. Les plaies difficiles comprennent les plaies chroniques (comme les ulcères de décubitus ou « plaies de lit », la gangrène et les ulcères de jambe), les ruptures de la barrière cutanée et les plaies chirurgicales qui ne guérissent pas comme prévu.

L'étude a mené aux conclusions suivantes :

- **Les plaies difficiles constituent une préoccupation courante.** Elles ont été déclarées chez près de 4 % des patients hospitalisés en soins de courte durée, plus de 7 % des clients des services à domicile, près de 10 % des résidents des établissements de soins de longue durée et près de 30 % des patients recevant des soins de longue durée en milieu hospitalier. Bien que la proportion de patients en soins de courte durée atteints de plaies difficiles était relativement faible (4 %), elle représentait tout de même 117 000 patients au Canada en 2011-2012.
- **Le nombre de plaies difficiles est vraisemblablement sous-déclaré, tout particulièrement chez les patients hospitalisés en soins de courte durée.** Les plaies à un stade précoce ne sont pas toujours correctement détectées et consignées.
- **Le diabète est un facteur de risque important pour les plaies difficiles.** Les patients diabétiques étaient beaucoup plus susceptibles de présenter une plaie difficile que les patients non diabétiques. Les complications du pied diabétique ont à elles seules entraîné plus de 2 000 amputations au Canada en 2011-2012.

Malgré les limites et les lacunes en matière de données, l'étude offre une perspective utile sur la prévalence des plaies évitables dans divers milieux de soins et prouve que les plaies constituent un lourd fardeau dans l'ensemble des milieux de soins examinés. Le rapport souligne l'importance de la prévention et de la prise en charge des plaies dans l'ensemble des milieux de soins, tout particulièrement dans les secteurs de la santé qui dispensent des services aux personnes atteintes de maladies chroniques.

[www.icis.ca](http://www.icis.ca)

Au cœur des données



Institut canadien  
d'information sur la santé

Canadian Institute  
for Health Information