

Indicateur : Tabagisme

Années de données : 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013

Description de l'indicateur : Taux de personnes de 18 ans et plus ayant déclaré fumer la cigarette tous les jours ou à l'occasion normalisé selon l'âge (taux par 100)

Justification : Le tabagisme et l'exposition à la fumée secondaire sont reconnus comme d'importants facteurs de risque du cancer du poumon, de maladies respiratoires et d'autres problèmes de santé. Le tabagisme est une importante cause évitable de morbidité et de décès au Canada^{1,2}.

Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Statistique Canada

Facteur de subdivision du revenu : Revenu rajusté autodéclaré des ménages tiré de l'ESCC

Description du dénominateur : Répondants de 18 ans et plus à l'ESCC

Exclusions :

1. Catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et « non déclaré »)
2. Répondants des 3 territoires (puisque les données sur les quintiles de revenu ne sont pas disponibles)

Description du numérateur : Répondants de 18 ans et plus à l'ESCC ayant déclaré fumer tous les jours ou à l'occasion

Méthode de normalisation selon l'âge : Normalisation directe selon l'âge en fonction de la population-type canadienne de 2011

Poids d'enquête : Niveau individuel

Groupes d'âge pour la normalisation (en années) : 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 et plus

Affectation géographique : Province de résidence du répondant selon le code postal dans l'ESCC

Couverture géographique : 10 provinces (territoires exclus)

Interprétation : Un faible taux est souhaitable.

Critères de sélection des cas : Répondants ayant déclaré fumer tous les jours ou à l'occasion

Variable : SMK_202

Question d'enquête : « Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais? » (SMK_Q202)

Pourcentage exclu, données sur le revenu manquantes

	2003	2005	2007-2008	2009-2010	2011-2012	2013
Pourcentage exclu*	14,9	14,6	15,1	17,3	12,7	11,6

Remarque

* Le pourcentage exclu correspond à la proportion de répondants à l'ESCC qui n'ont pas indiqué leur revenu pour cet indicateur et qui sont par conséquent exclus des analyses fondées sur les quintiles de revenu rajusté autodéclaré des ménages.

Description de la source des données :

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : L'ESCC est une enquête transversale qui vise à recueillir de façon continue des renseignements sur l'état de santé, l'utilisation des services de santé et les déterminants de la santé des Canadiens habitant dans la collectivité. Les données sont recueillies principalement pour des besoins de surveillance de la santé et de recherche en santé de la population. La population cible de l'ESCC comprend les Canadiens de 12 ans et plus de l'ensemble des provinces et des territoires. Sont exclus du champ de l'enquête les personnes vivant dans les réserves indiennes et sur les terres publiques, les personnes vivant en établissement, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées (région du Nunavik et région des Terres-Cries-de-la-Baie-James). En tout, ces exclusions représentent moins de 3 % de la population cible³.

Taille de l'échantillon : 130 000 personnes (avant 2007); 65 000 personnes (à compter de 2007)

Références

1. Baliunas D, Patra J, Rehm J, Popova S, Kaiserman M, Taylor B. Smoking-attributable mortality and expected years of life lost in Canada 2002: conclusions for prevention and policy. *Chronic Dis Can.* 2007;27(4):154-162.
2. Rehm J, Baliunas D, Brochu S, et al. *The Cost of Substance Abuse in Canada*. Ottawa (Ont.) : Centre canadien de lutte contre les toxicomanies; 2006.
3. Statistique Canada. Canadian Community Health Survey — Annual Component (CCHS). <http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226>. Modifié le 30 juillet 2014. Consulté le 2 février 2015.