

Description des Échelles de résultats (RAI-MDS 2.0)



Échelles de résultats	Description	Éléments de l'évaluation RAI-MDS 2.0	Pointage
DRS Échelle de mesure de la dépression	L'échelle peut servir au dépistage clinique de la dépression. Elle est comparée à l' échelle de dépression de Hamilton (HDRS) , l' échelle de dépression au cours des démences de Cornell (CSDD) et l' échelle de dépression de Calgary (CDS) .	L'échelle comprend sept éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Déclarations négatives (E1a) • Colère persistante (E1d) • Peurs non fondées (E1f) • Plaintes répétitives au sujet de la santé (E1h) • Plaintes ou préoccupations anxieuses répétitives (E1i) • Visage exprimant tristesse, douleur ou inquiétude (E1l) • Pleurs (E1m) 	0 à 14 Un score de 3 ou plus peut indiquer un problème de dépression réel ou potentiel.
CHES Échelle de mesure des changements de l'état de santé, des maladies en phase terminale, des signes et des symptômes	Conçue pour identifier les résidents dont l'état risque de se détériorer, l'échelle permet de détecter la fragilité et l'instabilité de l'état de santé.	L'échelle comprend neuf éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Changement dans l'état cognitif (B6) • Changement dans les AVQ fonctionnelles (G9) • Déshydratation (J1c) • Œdème (J1g) • Essoufflement (J1l) • Vomissement (J1o) • Phase terminale (J5c) • Perte de poids (K3a) • Laisse de la nourriture dans l'assiette (K4c) 	0 à 5 Des scores élevés indiquent des niveaux plus élevés de complexité médicale et sont associées à des résultats défavorables comme la mortalité, l'hospitalisation, la douleur, le stress de l'aidant naturel et un mauvais état de santé autodéclaré.
Échelle de douleur	L'échelle sert à évaluer la présence de la douleur et son intensité. Les résultats se comparent bien à l' échelle visuelle analogique .	L'échelle comprend deux éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Fréquence (J2a) • Intensité (J2b) 	0 à 3 Des scores plus élevés indiquent des douleurs plus fortes.
Échelle hiérarchique AVQ* * Activités de la vie quotidienne	L'échelle permet d'évaluer l'évolution de l'invalidité en regroupant les niveaux d'exécution des AVQ en catégories distinctes, soit perte précoce (hygiène personnelle), perte normale (déplacement, utilisation des toilettes) et perte tardive (alimentation).	L'échelle comprend quatre éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène personnelle (G1jA) • Utilisation des toilettes (G1iA) • Déplacement (G1eA) • Alimentation (G1hA) 	0 à 6 Des scores élevés indiquent un déclin plus marqué (perte progressive) dans l'exécution des AVQ.
Échelle sur les activités de la vie quotidienne (AVQ), version courte	L'échelle permet d'évaluer la performance du résident dans les AVQ en fonction d'éléments reflétant différents niveaux de perte (précoce, normale et tardive).	L'échelle comprend quatre éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène personnelle (G1jA) • Utilisation des toilettes (G1iA) • Déplacement (G1eA) • Alimentation (G1hA) 	0 à 16 Des scores élevés indiquent une perte accrue d'autonomie dans l'exécution des AVQ.
Échelle sur les activités de la vie quotidienne (AVQ), version longue	L'échelle permet d'évaluer la capacité du résident d'exécuter les AVQ. La version longue porte davantage attention aux changements cliniques que les autres échelles sur les AVQ.	L'échelle comprend sept éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Mobilité dans le lit (G1aA) • Transfert (G1bA) • Déplacement (G1eA) • Habillage (G1gA) • Alimentation (G1hA) • Utilisation des toilettes (G1iA) • Hygiène personnelle (G1jA) 	0 à 28 Des scores élevés indiquent une perte accrue d'autonomie dans l'exécution des AVQ.

Échelles de résultats	Description	Éléments de l'évaluation RAI-MDS 2.0	Pointage
ISE Échelle d'engagement social	Cette échelle permet de décrire le sens de l'initiative du résident et sa participation à la vie de l'établissement.	L'échelle comprend six éléments : <ul style="list-style-type: none"> • À l'aise dans les contacts avec autrui (F1a) • À l'aise de participer à des activités planifiées ou encadrées (F1b) • À l'aise d'entreprendre des activités par soi-même (F1c) • Se fixe ses propres objectifs (F1d) • Participe à la vie de l'établissement (F1e) • Accepte de participer à la plupart des activités de groupe (F1f) 	0 à 6 Des scores élevés indiquent un niveau supérieur de participation. Remarque : Contrairement aux autres échelles interRAI, un score élevé sur l'échelle ISE constitue un élément positif.
ABS Échelle de comportements agressifs	Cette échelle permet d'évaluer les comportements agressifs. Elle est étroitement corrélée à la sous-échelle d'inventaire d'agitation de Cohen-Mansfield (CMAI)	L'échelle comprend quatre éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Agressivité verbale (E4b) • Agressivité physique (E4c) • Comportement socialement inapproprié ou perturbateur (E4d) • Résistance aux soins (E4e) 	0 à 12 Des scores élevés indiquent des niveaux élevés de comportements agressifs.
interRAI PURS Risque d'ulcère de décubitus	L'échelle permet d'évaluer le risque de développement d'ulcère de décubitus.	L'échelle comprend sept éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Mobilité dans le lit (G1aA) • Déplacement dans la chambre (G1cA) • Continence fécale (H1a) • Essoufflement (J1I) • Douleur quotidienne (J2a) • Perte de poids (K3a) • Antécédents d'ulcères guéris (M3); ou Escarre de décubitus (M2a) s'il s'agit d'une évaluation trimestrielle 	0 à 8 Des scores élevés indiquent un risque relatif élevé de développer un ulcère de décubitus.
CPS Échelle de rendement cognitif	Cette échelle permet de décrire l'état cognitif d'un résident. Les résultats sont comparés au Mini-examen de l'état mental (MMSE) et au Test de déficience grave (TSI) Le tableau ci-dessous illustre le lien entre le score de l'échelle de rendement cognitif du RAI-MDS 2.0 et celle du MMSE.	L'échelle comprend cinq éléments : <ul style="list-style-type: none"> • État comateux [B1] • Mémoire à court terme (B2a) • Habiletés cognitives dans la prise de décisions quotidiennes (B4) • Capacité d'expression (C4) • Alimentation (G1hA) 	0 à 6 Des scores élevés indiquent des déficiences cognitives plus graves.

Score CPS	Description	Moyenne MMSE équivalente
0	Intact	25
1	Tout juste intacte	22
2	Déficience légère	19
3	Déficience modérée	15
4	Déficience modérée/grave	7
5	Déficience grave	5
6	Déficience très grave	1