



www.icis.ca  
Au cœur des données



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

## Condensé

Septembre 2014

Les banques de données de l'ICIS donnent de l'information sur les troubles de l'alimentation des femmes et des filles au Canada. Pour les besoins de la présente analyse, nous avons utilisé notamment la Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier (BDSMMH) — une ressource d'information pancanadienne sur les sorties des patients hospitalisés en psychiatrie — et le Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA), qui contient des données sur les visites au service d'urgence et en soins ambulatoires.

### Autres ressources

Les produits complémentaires suivants sont offerts sur le **site Web de l'ICIS** :

- fiche d'information
- tableaux de données

### Contactez-nous

Renseignements  
sur les données :  
[bdsmmh@icis.ca](mailto:bdsmmh@icis.ca)

Demandes des médias :  
[media@icis.ca](mailto:media@icis.ca)

## Plus de jeunes femmes sont hospitalisées pour des troubles de l'alimentation

### Utilisation des services hospitaliers pour les troubles de l'alimentation au Canada

De 2006-2007 à 2012-2013, le taux d'hospitalisation de femmes au Canada<sup>i</sup> en raison d'un trouble de l'alimentation est demeuré stable, sauf chez les adolescentes âgées de 10 à 19 ans, dont le taux a augmenté de 42 % au cours des 2 dernières années.

Le nombre de visites au service d'urgence a par ailleurs augmenté chez les femmes de ce groupe d'âge au cours des 3 dernières années examinées (2010-2011 à 2012-2013). En Alberta et en Ontario (les provinces pour lesquelles des données complètes sur les services d'urgence sont disponibles), le taux a grimpé de 27 à 45 par 100 000 femmes.

### Principaux résultats

- En 2012-2013, 1 585 femmes, dont plus de la moitié étaient des filles de 10 à 19 ans, ont été hospitalisées pour des troubles de l'alimentation. La même année, 103 hommes ont été hospitalisés en raison d'un trouble de l'alimentation, tous groupes d'âges combinés.
- La durée moyenne du séjour à l'hôpital des femmes était légèrement plus élevée que celle des hommes (33,3 jours contre 31,6 jours).
- Environ 28 % des visites au service d'urgence pour des troubles de l'alimentation ont été suivies d'une admission à l'hôpital en soins de courte durée.
- Les 3 maladies mentales les plus souvent diagnostiquées chez les femmes atteintes de troubles de l'alimentation ayant visité un service d'urgence sont la dépression, les troubles anxieux ainsi que la réaction à un facteur de stress sévère et les troubles de l'adaptation.

i. Les données du Québec ont été exclues de l'analyse.