



Condensé

Mars 2015

À l'aide de données récentes sur la facturation des médecins, l'ICIS examine les taux de suivi des patients par un médecin dans les 7 et 30 jours suivant leur sortie de l'hôpital en Alberta et en Saskatchewan. Le rapport présente les résultats par province et région sanitaire et fournit de l'information sur les facteurs liés au patient, au médecin, à l'hôpital et à la collectivité qui influent sur les taux de suivi.

Autres ressources

Les produits complémentaires suivants sont offerts sur le **site Web de l'ICIS** :

- rapport
- tableaux de données
- avis aux intervenants

Contactez-nous

Renseignements sur les données : hsr@icis.ca

Demandes des médias : media@icis.ca

www.icis.ca

Au cœur des données



Institut canadien
d'information sur la santé

Canadian Institute
for Health Information

Le suivi du médecin réduit-il les complications après la sortie de l'hôpital?

Rapport — Suivi du médecin après la sortie de l'hôpital : progrès dans l'adoption de pratiques exemplaires

Le suivi après la sortie de l'hôpital facilite la transition du patient de l'hôpital à la collectivité. Il permet aussi au médecin d'apprendre ce qui s'est passé à l'hôpital et de voir si l'état du patient évolue comme prévu.

Le suivi contribue à l'amélioration de la continuité des soins, ce qui offre de nombreux avantages, comme la réduction du nombre d'erreurs médicales et une meilleure communication entre les dispensateurs de soins. Le patient qui bénéficie d'un suivi peut ainsi participer activement à son traitement au quotidien en faisant certains choix concernant sa médication et son alimentation, et en surveillant les complications de sa maladie.

L'étude porte sur les patients de l'Alberta et de la Saskatchewan qui ont été hospitalisés en raison d'un infarctus aigu du myocarde (IAM), d'une insuffisance cardiaque (IC) ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Principaux résultats

- La majorité des patients (77 à 92 %) ont vu un médecin dans le mois suivant leur sortie.
- En général, les patients qui ont obtenu leur congé d'un petit hôpital ou d'un hôpital en région éloignée, qui vivaient dans un quartier à faible revenu ou qui accédaient difficilement à des soins de santé étaient moins susceptibles de consulter un médecin après leur sortie, comparativement à ceux ayant obtenu leur congé d'un grand hôpital ou d'un hôpital en milieu urbain. C'est particulièrement le cas dans les 7 jours suivant la sortie.
- Le nombre de visites de suivi était plus élevé chez les patients qui avaient un médecin habituel, en particulier chez les personnes atteintes d'une IC ou d'une MPOC.
- Au moins le tiers des patients ont vu un médecin dans les 7 jours suivant leur sortie de l'hôpital. Le taux de suivi dans les 7 jours était plus élevé chez les patients victimes d'un IAM.