

Description des Échelles de résultats (RAI-HC)



Échelle de résultats	Description	Éléments de l'évaluation RAI-HC	Pointage
DRS Échelle de mesure de la dépression	Cette échelle peut servir au dépistage clinique de la dépression. Elle est comparée à l' échelle de dépression de Hamilton (HDRS) , l' échelle de la dépression et au cours des démences de Cornell (CSDD) , et l' échelle de dépression de Calgary (CDS) .	L'échelle comprend sept éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Sentiment de tristesse, d'être déprimé (E1a) • Colère persistante (E1b) • Peurs non fondées (E1c) • Plaintes répétitives au sujet de la santé (E1d) • Plaintes ou préoccupations anxieuses répétitives (E1e) • Visage exprimant tristesse ou inquiétude (E1f) • Pleurs (E1g) 	0 à 14 Un score de 3 ou plus peut indiquer un problème de dépression réel ou potentiel.
CHES Échelle de mesure des changements de l'état de santé, des maladies en phase terminale, des signes et des symptômes	Conçue pour identifier les clients dont l'état risque de se détériorer, l'échelle permet de détecter la fragilité et l'instabilité de l'état de santé.	L'échelle comprend neuf éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Détérioration de la faculté de prendre des décisions (B2b) • Déclin dans les AVQ (H3) • Vomissements (K2a) • Œdème (K3d) • Essoufflement (K3e) • Phase terminale (K8e) • Perte de poids (L1a) • Déshydratation (L2c) • Laisse de la nourriture dans l'assiette (L2b) 	0 à 5 Des scores élevés indiquent des niveaux plus élevés de complexité médicale et sont associés à des résultats défavorables comme la mortalité, l'hospitalisation, la douleur, le stress de l'aidant naturel et un mauvais état de santé autodéclaré.
Échelle de douleur	L'échelle sert à évaluer la présence de la douleur et son intensité. Les résultats se comparent bien à l' échelle visuelle analogique .	L'échelle comprend deux éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Fréquence (K4a) • Intensité (K4b) 	0 à 3 Des scores élevés indiquent des douleurs plus fortes.
Échelle hiérarchique AVQ* *Activités de la vie quotidienne	L'échelle permet d'évaluer l'évolution de l'invalidité en regroupant les niveaux d'exécution des AVQ en catégories distinctes, soit perte précoce (hygiène personnelle), perte intermédiaire (déplacement, utilisation des toilettes) et perte tardive (alimentation).	L'échelle comprend quatre éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène personnelle (H2i) • Utilisation des toilettes (H2h) • Déplacement (H2c) • Alimentation (H2g) 	0 à 6 Des scores élevés indiquent un déclin plus marqué (perte progressive) dans l'exécution des AVQ.
Échelle sur les AVQ — version courte	L'échelle permet d'évaluer la performance du client dans les AVQ en fonction d'éléments reflétant différents niveaux de perte (précoce, intermédiaire et tardive).	L'échelle comprend quatre éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Hygiène personnelle (H2i) • Utilisation des toilettes (H2h) • Déplacement (H2c) • Alimentation (H2g) 	0 à 16 Des scores élevés indiquent une perte accrue d'autonomie dans l'exécution des AVQ.

Échelle de résultats	Description	Éléments de l'évaluation RAI-HC	Pointage																								
Échelle sur les AVQ — version longue	L'échelle permet d'évaluer la capacité du client d'exécuter les AVQ. La version longue porte davantage attention aux changements cliniques que les autres échelles sur les AVQ.	L'échelle comprend sept éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Mobilité dans le lit (H2a) • Transfert (H2b) • Déplacement (H2c) • Habillage du haut et du bas du corps (H2e et H2f) • Alimentation (H2g) • Utilisation des toilettes (H2h) • Hygiène personnelle (H2i) 	0 à 28 Des scores élevés indiquent une perte accrue d'autonomie dans l'exécution des AVQ.																								
Échelle de difficulté dans les AIVQ* *Activités instrumentales de la vie quotidienne	L'échelle permet d'évaluer la capacité d'un client à accomplir des tâches ainsi que les difficultés qu'il rencontre, en fonction d'éléments reflétant différents niveaux de perte (précoce, intermédiaire et tardive).	L'échelle comprend trois éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Travaux ménagers courants (H1bB) • Préparation des repas (H1aB) • Utilisation du téléphone (H1eB) 	0 à 6 Des scores élevés indiquent une difficulté accrue.																								
Échelle de participation aux AIVQ	Cette échelle évalue le rendement du client en ce qui concerne les sept tâches liées aux AIVQ.	L'échelle comprend sept éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Préparation des repas (H1aA) • Travaux ménagers courants (H1bA) • Gestion des finances (H1cA) • Gestion des médicaments (H1dA) • Utilisation du téléphone (H1eA) • Magasinage (H1fA) • Transport (H1gA) 	0 à 21 Des scores élevés indiquent que le client dépend davantage des autres.																								
interRAI PURS Échelle de risque d'ulcères de décubitus	L'échelle permet d'évaluer le risque de développement d'un ulcère de décubitus.	L'échelle comprend sept éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Mobilité dans le lit (H2a) • Déplacement à l'intérieur du domicile (H2c) • Continence fécale (I3) • Essoufflement (K3e) • Fréquence de la douleur (K4a) • Perte de poids involontaire (L1a) • Antécédents d'ulcères de décubitus (N4) 	0 à 8 Des scores élevés indiquent un risque relatif élevé de développer un ulcère de décubitus.																								
CPS Échelle de rendement cognitif	<p>Cette échelle permet de décrire l'état cognitif d'un client.</p> <p>Les résultats sont comparés au mini-examen de l'état mental (MMSE) et au test de déficience grave (TSI).</p> <p>Le tableau ci-dessous illustre le lien entre le score de l'échelle de rendement cognitif du RAI-HC et celle du MMSE.</p> <table border="1" data-bbox="405 1133 1014 1365"> <thead> <tr> <th>Score CPS</th> <th>Description</th> <th>Moyenne MMSE équivalente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Intact</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tout juste intact</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Déficience légère</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Déficience modérée</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Déficience modérée/grave</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Déficience grave</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Déficience très grave</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Score CPS	Description	Moyenne MMSE équivalente	0	Intact	25	1	Tout juste intact	22	2	Déficience légère	19	3	Déficience modérée	15	4	Déficience modérée/grave	7	5	Déficience grave	5	6	Déficience très grave	1	L'échelle comprend quatre éléments : <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire à court terme (B1a) • Habiletés cognitives dans la prise de décisions quotidiennes (B2a) • Capacité d'expression : capacité de se faire comprendre (C2) • Problème lié à l'alimentation (H2g) 	0 à 6 Des scores élevés indiquent des déficiences cognitives plus graves.
Score CPS	Description	Moyenne MMSE équivalente																									
0	Intact	25																									
1	Tout juste intact	22																									
2	Déficience légère	19																									
3	Déficience modérée	15																									
4	Déficience modérée/grave	7																									
5	Déficience grave	5																									
6	Déficience très grave	1																									