



Condensé

Mars 2015

Pour en savoir davantage, veuillez consulter les données interactives sur les **hospitalisations et l'accouchement** dans les Statistiques éclair de l'ICIS. Des **tableaux préformatés** sont également disponibles sur les 10 principales causes d'hospitalisation et de chirurgie, les naissances à l'hôpital, les taux normalisés d'hospitalisation et la durée moyenne du séjour. Ces données ne concernent que les hospitalisations en soins de courte durée.

Autres ressources

Les produits complémentaires suivants sont offerts sur le **site Web de l'ICIS** :

- tableaux de données
- fiche d'information

Contactez-nous

Renseignements
sur les données :

bdca@icis.ca

Demandes des médias :

media@icis.ca

www.icis.ca

Au cœur des données



Institut canadien
d'information sur la santé

Canadian Institute
for Health Information

Les causes d'hospitalisation et de chirurgie varient au Canada

Indicateurs d'hospitalisation, de chirurgie et d'accouchement 2013-2014

Les accouchements et les maladies respiratoires chroniques figuraient parmi les 5 principales causes d'hospitalisation dans chaque province et territoire du Canada, mais les causes d'hospitalisation et de chirurgie variaient d'une région à l'autre du pays.

Par exemple, la tuberculose était l'une des 10 principales causes d'hospitalisation seulement au Nunavut.

Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie, comme les troubles de l'humeur, la schizophrénie et les autres états délirants, comptaient parmi les causes les plus courantes d'hospitalisation à l'échelle du pays et dans chaque province et territoire, sauf en Nouvelle-Écosse et au Manitoba.

Principaux résultats

- Les accouchements ont représenté 367 090 hospitalisations, avec une durée moyenne du séjour (DMS) de 2,3 jours.
- La chirurgie avec hospitalisation la plus courante au Canada était la césarienne, avec une DMS de 3,3 jours. Cependant, le taux de naissances à l'hôpital a légèrement baissé au cours des dernières années.
- Le taux de césariennes primaires est demeuré plus élevé chez les femmes de 35 ans et plus que chez les plus jeunes.
- Le taux d'anesthésies épidurales au cours d'un accouchement vaginal a augmenté à l'échelle nationale, passant de 53,2 % en 2006-2007 à 58,7 % en 2013-2014. Le taux d'anesthésies épidurales a varié entre les provinces et territoires, oscillant entre 6,5 % et 72,0 %.
- Les taux de naissances prématurées et de nouveau-nés petits pour l'âge gestationnel sont demeurés stables.

10 principales causes d'hospitalisation au Canada

1. Accouchement
2. Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
3. Infarctus
4. Insuffisance cardiaque congestive
5. Arthrose du genou
6. Pneumonie
7. Autres causes médicales (p. ex. soins palliatifs, chimiothérapie)
8. Troubles de l'humeur
9. Schizophrénie et autres états délirants
10. Fracture du fémur